

 **3x** TRATA 3X MAIS ANIMAIS
(ÚNICO FIPRONIL 3%)



RÁPIDA ABSORÇÃO
(FORMULAÇÃO EXCLUSIVA*)



ÚNICO FIPRONIL
POUR ON E SPOT ON



A MENOR **CARÊNCIA**
PARA ABATE (67 DIAS)

O GATILHO MAIS RÁPIDO CONTRA OS ECTOPARASITAS

POUR ON & SPOT ON



★ MORTOS ★



"CARRAPATO"



"BICHEIRA"



"MOSCA DOS ESTÁBULOS
E MOSCA DOS CHIFRES"



"BERNE "

RECOMPENSA

REBANHO SADIO
E LIVRE DOS
ECTOPARASITAS



O PROBLEMA

Os 5 principais ectoparasitas dos bovinos geram prejuízos de aproximadamente **7 bilhões de dólares** no rebanho brasileiro (Grisi et al., 2014).

Pensando nisso, a Ceva Saúde Animal inova com uma solução para controle desse problema:

FIPROLINE DUO
POUR ON & SPOT ON

FIPROLINE DUO previne e trata as infestações por estes principais ectoparasitas dos bovinos:

- **Mosca dos chifres** (*Haematobia irritans*);
- **Carrapato** (*Rhipicephalus microplus*);
- **Larvas da Bicheiras** (*Cochliomyia hominivorax*);
- **Larvas da Berne** (*Dermatobia hominis*);
- **Mosca dos estábulos** (*Stomoxys calcitrans*).

FORMULAÇÃO:

Fipronil _____ **3%**
Veículo (excipientes)* q.s.p _____ **100mL**

*Possui corante vermelho para identificação dos animais tratados.

MODO DE USAR:

Administrar **FIPROLINE DUO** em bovinos, pelas duas vias de aplicação abaixo:

Pour on (Sobre a linha média superior do corpo - "fio do lombo")

- Dose única
- 1mL/30Kg P.V. (1 mg de fipronil/kg PV)

Spot on (Em um único ponto, preferencialmente na região dorso-cervical - região da cruz)

- Dose única
- 1mL/15Kg P.V. (2 mg de fipronil/kg PV)

Peso Kg PV	Via Pour On (1mL/30Kg)	Via Spot On (1mL/15Kg)
150Kg	5mL	10mL
300Kg	10mL	20mL
450Kg	15mL	30mL
600Kg	20mL	40mL

Acima de 600Kg, aplicar 1mL/30Kg pour on e 1mL/15Kg spot on
Apresentações: 250mL, 1 litro e 5 litros

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Abate: 67 dias após a última aplicação.

Leite: produto não indicado para vacas produtoras de leite para consumo humano.

